

FICHA TÉCNICA

VETALGINA®

Registro ICA No. 571-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Metamizol sódico monohidratado (Dipirona sódica) 500 mg
 Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

En bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y perros como analgésico, antiespasmódico y antipirético.

ESPECIE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Equinos, Caprinos, Porcinos y Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa o intramuscular.

En todos los casos se aconseja aplicar la mitad de la dosis por vía intravenosa, si es posible, y la otra mitad vía intramuscular.

Aplicar diariamente hasta la desaparición de los síntomas.

Equinos	2-5 mL/50 Kg de p.v.
Bovinos, Ovinos, Caprinos	2-4 mL/50 Kg de p.v.
Porcinos	0.3-1 mL/10 Kg de p.v.
Perros	0.04-0.1 mL/Kg de p.v

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos

No aplicar por vía subcutánea

No usar en animales con disturbios en el sistema hematopoyético



TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 12 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

2

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos 20 mL, 50 mL y 100 mL

FABRICADO POR:

Intervet International GmbH.
Alemania

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia