



FICHA TÉCNICA

IMIZOL®

Registro ICA No. 1951-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene

Dipropionato de Imidocarb

0.12 g

Excipientes c.s.p.

100 mL

INDICACIONES

Para el control de la babesiosis en bovinos, equinos y perros; para el control de la anaplasmosis en bovinos.

ESPECIES DESTINO

Bovinos, Equinos y Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Imizol® se puede administrar por vía intramuscular y subcutánea.

No administrar vía intravenosa.

Bovinos: 2.5 mL/100 Kg

Equinos: 2 mL/100 Kg

Perros: 0.5 mL/10 Kg

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 213 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 6 día después de finalizado el mismo, no debe darse el consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Conservar a menos de 25°C.

Protéjase de la luz.



ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

2

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 10 mL, 40 mL y 100 mL.

FABRICADO POR

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Alemania

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia