

FICHA TÉCNICA

PANACUR® 10%

Registro ICA No. 1202-DB
 USO VETERINARIO



1

DESCRIPCIÓN

Antihelmíntico oral de amplio espectro de acción contra los estados maduros e inmaduros de los parásitos gastrointestinales y pulmonares del ganado bovino y ovino.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de suspensión oral contiene:

Fenbendazol	100 mg
Excipientes c. s. p.	1 mL

INDICACIONES

En ganado bovino y ovino como antihelmíntico para el control de *Haemonchus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Cooperia sp.*, *Nematodirus sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Bunostomum sp.*, *Strongyloides sp.*, *Toxocara sp.*, *Dictyocaulus sp.*, *Trichostrongylus sp.* y *Moniezia sp.*

ESPECIE DESTINO

Bovinos y Ovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos:

5 mg de Fenbendazol/kg de peso (equivalente a 1 ml por cada 20 kg de peso).

Ovinos:

5.2 mg de Fenbendazol/kg de peso (equivalente a 1.3 ml por cada 25 kg de peso).

Para infestaciones con *Moniezia sp.* es necesario administrar 10 mg de Fenbendazol/kg de peso (equivalente a 1 ml por cada 10 kg de peso).

Recomendaciones de dosificación de bovinos				Cantidad de bovinos que se pueden vermifugar con este envase			
50 Kg	2.5 mL	300 Kg	15.0 mL	De 50 Kg	400	De 300 Kg	66
100 Kg	5.0 mL	350 Kg	18.0 mL	De 100 Kg	200	De 350 Kg	57
150 Kg	8.0 mL	400 Kg	20.0 mL	De 150 Kg	133	De 400 Kg	50
200 Kg	10.0 mL	450 Kg	23.0 mL	De 200 Kg	100		
250 Kg	13.0 mL	500 Kg	25.0 mL	De 250 Kg	80		



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

La frecuencia de administración depende de la edad, tipo de animal y dinámica de población de los parásitos.

No administrar en casos conocidos de hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

2

TIEMPO DE RETIRO

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 11 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 120 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. Los ovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 30 °C

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Fuelle por 20 mL.

Jeringa por 25 mL.

Frasco por 20 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, 1900 mL y 2500 mL.

FABRICADO POR

MSD Saúde Animal LTDA
Brasil

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia