

FICHA TÉCNICA

LACTOTROPINA®

Registro ICA No. 4300-DB

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 1,4 mL de suspensión inyectable contiene:

Somatotropina Bovina zinc

500 mg

Excipientes c.s.p.

1,4 mL

DESCRIPCIÓN

La Lactotropina® es una formulación estéril de liberación prolongada de somatotropina inyectable, que contiene 500 mg por cada jeringa.

La Lactotropina® se utiliza para aumentar la producción de leche y eficiencia productiva en vacas lecheras sanas y en adecuadas condiciones nutricionales.

ESPECIE DESTINO

Bovinos (leche)

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La Lactotropina® se administra cada 14 días una inyección subcutánea, comenzando 9 semanas después del parto; el programa puede continuar hasta 15 días antes del secado. Permita que las jeringas alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de su administración. Evitar altas temperaturas y exposición a la luz solar. Inyectar el total del contenido de la jeringa. La Lactotropina® debe de inyectarse por vía subcutánea (bajo la piel). Los sitios recomendados para aplicar la inyección son: en el área del cuello, en la región pos-escapular (por detrás del hombro) o en la depresión a los dos lados de la base de la cola, en cualquiera de los dos lados. Alterne el lado derecho e izquierdo de la vaca en inyecciones consecutivas. Se debe tener cuidado para evitar el hueso, los músculos, tendones y tendones de la cola, así como los músculos anales y rectales. El sitio de inyección debe estar libre de suciedad superficial. Se debe inyectar el contenido completo subcutáneamente. No vuelva a utilizar las jeringas. No inyecte en el pliegue caudal de la cola. Las estructuras que se deben evitar pueden localizarse fácilmente al levantar la cola del animal. Si el uso de Lactotropina® se interrumpió, se podrá continuar más adelante en la lactación. Se recomienda un buen manejo y nutrición para una óptima producción. La respuesta en producción de cada vaca puede variar.



REACCIONES ADVERSAS

Se puede desarrollar inflamación temporal en el sitio de inyección.

ALMACENAMIENTO

Consérvese refrigerado (2°C-8°C). Protegido de la luz solar y el calor excesivo. No congelar. Mantener la jeringa a temperatura ambiente (15°C-30°C) antes de su uso.

ADVERTENCIAS

Evite el contacto con los ojos, boca, piel y ropa.

Lactotropina® es una proteína. El contacto frecuente de la piel con proteínas puede ocasionar una reacción alérgica en ciertos individuos, por lo que se recomienda lavarse bien las manos y piel con jabón y agua.

El manejo inadecuado de la producción y el control deficiente de los forrajes puede traducirse en trastornos de la reproducción y en mastitis.

Se recomienda que se realice un seguimiento de la incidencia de mastitis clínica y el uso de antimicrobianos en los hatos donde se suministre el producto.

Consulte a su representante de ventas de MSD Salud Animal Colombia para un plan de seguimiento adecuado.

TIEMPO DE RETIRO

Cero (0) días

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja por 25 o 100 jeringas de 1,4 mL

FABRICADO POR:
UNION AGENER INC.
Estados Unidos

IMPORTADO POR:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia