



## FICHA TÉCNICA

### CIRCUMVENT® C-M-L

Registro ICA No. 11575-BV

USO VETERINARIO

Organismo Genéticamente Modificado

1

### DESCRIPCIÓN

Vacuna de Circovirus Porcino Tipo 2, Vector Baculovirus inactivado, *Lawsonia intracellularis* y Bacterina *Mycoplasma hyopneumoniae*

### COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL de emulsión inyectable contiene:

Antígeno subunitario ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2  $\geq 1.4$  PR\*

*Mycoplasma Hyopneumoniae* inactivado, Cepa 11  $\geq 1.2$  PR\*

*Lawsonia intracellularis* inactivado  $\geq 1.5$  PR\*

Excipientes c. s. p. 2 mL

\*PR: Potencia relativa

### INDICACIONES

Para uso en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores para la prevención de la enfermedad causada por Circovirus Porcino Tipo 2d, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Lawsonia intracellularis*.

#### Inicio de la inmunidad:

PCV 2d: 4 semanas posvacunación

*M. hyopneumoniae*: 5 semanas posvacunación

*L. intracellularis*: 5 semanas posvacunación

#### Duración de la inmunidad:

PCV Tipo 2d: al menos 16 semanas posvacunación

*M. hyopneumoniae*: al menos 10 semanas posvacunación

*L. intracellularis*: al menos 20 semanas posvacunación

### ESPECIE DESTINO

Porcinos

### FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Agitar bien.

Lleve la vacuna a temperatura ambiente inmediatamente antes de la administración.



Utilizar la técnica aséptica, inyectar 2 mL intramuscular (IM) en cerdos de 3 semanas de edad o mayores. Para recomendaciones sobre la frecuencia de revacunación, consulte con su médico veterinario.

### **PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**

No mezclar con otros productos.

Este producto no ha sido probado en animales en periodo de gestación o lactancia.

Use el contenido completo una vez abierto

### **TIEMPO DE RETIRO**

No vacunar dentro de los 60 días antes del sacrificio.

### **ALMACENAMIENTO**

Conservar entre 2°C - 8°C protegido de la luz. No congelar.

### **ADVERTENCIAS**

Un número significativo de cerdos podrían presentar una leve inflamación en el sitio de inyección. La inflamación debe resolverse sin tratamiento en menos de 29 días. Reacciones inmediatas sistémicas se han observado en animales donde se ha administrado el producto. Minimizar la manipulación de cerdos y asegurar la ventilación apropiada antes de iniciar la vacunación.

Si se presenta alguna reacción anafiláctica una vez se administre la vacuna, utilizar epinefrina en la dosis que recomiende el Médico Veterinario.

Use con cuidado para evitar autoinyectarse sus dedos, manos o cualquier parte del cuerpo. La inyección accidental puede causar reacciones locales. En caso de autoinyección en humanos, contacte al médico.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

### **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 100 mL (50 dosis), 500 mL (250 dosis) y 1.000 mL (500 dosis)

### **FABRICADO POR**

Intervet Inc.

Estados Unidos

### **IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal S.A.S.

Bogotá, Colombia