



FICHA TÉCNICA

BOVILIS® ROTAVEC® CORONA

Registro ICA No. 9750-BV

USO VETERINARIO



1

DESCRIPCIÓN

Vacuna inactivada contra Rotavirus bovino, Coronavirus bovino y *Escherichia coli*

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL antes de inactivar contiene:

Rotavirus Bovino, cepa UK Compton, Grupo A, Serotipo G6 P5 ≥ 874 U*

Coronavirus Bovino, cepa Mebus ≥ 340 U*

Escherichia coli, cepa CN7985 (K99+:F41+) ≥ 560 U*

Excipientes c.s.p 2 mL

* Unidades determinadas en prueba de potencia *in vitro*

INDICACIONES

Para la inmunización activa de vacas y novillas preñadas contra el antígeno F5 adhesina F5(K99+) y F41 de *E. coli*, Rotavirus y Coronavirus.

Los anticuerpos calostrales han demostrado reducir la gravedad de la diarrea causada por *E. coli*, reducir la incidencia de la diarrea causada por rotavirus y reducir la diseminación viral por parte de los terneros infectados con rotavirus y coronavirus.

ESPECIE DESTINO

Bovinos: vacas preñadas y novillas

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

2 mL vía intramuscular en la tabla del cuello. Dosis única.

Aplicar entre 12 a 3 semanas antes de la fecha probable de parto.

Modo de uso:

Agitar bien antes de usar. Administrar en forma aséptica



Alimentación con calostro:

Terneros amamantados de forma natural: recibirán el calostro directamente a partir de las vacas vacunadas.

2

Terneros alimentados artificialmente con calostro mezclado: el calostro se puede almacenar bajo 20°C pero debe utilizarse lo antes posible, ya que los anticuerpos pueden caer hasta un 50% luego de 28 días de almacenamiento.

Se recomienda almacenarlo a 4°C. Se debe alimentar a los terneros a razón de 2,5 a 3,5 litros por día (de acuerdo al tamaño corporal) durante las 2 primeras semanas de vida.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 8 horas.

Contraindicaciones

Ninguna

Efectos adversos o reacciones adversas

Ocasionalmente, se puede observar una leve inflamación de hasta 1 cm en el sitio de inyección, la cual se absorberá dentro de 14 a 21 días.

Pueden ocurrir ocasionalmente reacciones de hipersensibilidad. En dichos casos se debe administrar de inmediato un tratamiento apropiado como adrenalina.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Se debe asegurar que los terneros reciban calostro de las madres vacunadas en las 6 horas siguientes al nacimiento y durante las 2-4 primeras semanas de vida.

Periodo de resguardo

Cero días

Precauciones especiales para el operador

Bovilis® Rotavec® Corona contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto-inyección puede provocar dolor agudo e inflamación, particularmente si es inyectado en una articulación o dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no recibe una pronta atención médica. En caso de ser inyectado accidentalmente con este producto médico veterinario, busque atención médica inmediata incluso si una cantidad muy pequeña ha sido inyectada y lleve el inserto con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque nuevamente atención médica.



ALMACENAMIENTO

Conservar y transportar entre 2 °C y 8 °C.

Proteger de la luz. No congelar.

ADVERTENCIAS

Interacciones

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Todos los materiales de productos o residuos no utilizados deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 1 dosis, 5 dosis, 20 dosis y 50 dosis.

FABRICADO POR

Burgwedel Biotech GmbH

Alemania

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia