

FICHA TÉCNICA

CEPRAVIN® VACA SECA

Registro ICA No. 3699-DB

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 3 g contiene:

Cefalonium dihidratado

250 mg

Excipientes c.s.p

3 g



INDICACIONES

Tratamiento de rutina de la vaca seca, para tratar infecciones subclínicas. El producto es activo contra *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Corynebacterium ulcerans*, *Trueperella pyogenes*, *Streptococcus uberis*, *E. coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.* y *Citrobacter spp.*

Aplicar al momento de secar la vaca, para reducir el riesgo de mastitis que comúnmente ocurre al momento del parto.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solición inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cado cuarto, inmediatamente después del último ordeño de la lactancia.

Antes de la aplicación el pezón debe ordeñarse completamente, limpiarse y desinfectarse.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No debe usarse en vacas lactantes.

Si el parto se presenta antes de 54 días después del tratamiento, debe verificarse la ausencia de antibiótico en la leche antes de utilizarla para consumo humano. La leche es apta para consumo humano una vez transcurrido 54 días más 96 horas después del tratamiento.

No manipular si es alérgico a penicilinas y/o cefalosporinas. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar elementos de protección personal. Si presenta síntomas por contacto con el producto consulte al médico de urgencia y presente la etiqueta.


Las cefalosporinas no deben administrarse conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos.




1. Antes de la aplicación, el pezón debe ser completamente ordeñado, limpiado y desinfectado.



2. Retirar la tapa completamente sosteniendo el cilindro de la jeringa firmemente en una mano y con el dedo pulgar empujar la tapa hasta que caiga. Evitar contaminar la boquilla de la jeringa.



3. Aplicar en el canal del pezón de cada cuarto el contenido de una jeringa, inmediatamente después del último ordeño de la lactancia.



4. Después de la aplicación, es aconsejable sumergir el pezón en una preparación antiséptica, especialmente diseñada para este propósito.

Cepravin® Vaca Seca debe ser utilizado bajo supervisión veterinaria. Se recomienda realizar un antibiograma previo a su uso.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante las 96 horas siguientes al parto no debe darse al consumo humano. No debe usarse en vacas lactantes.

ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 30 ° C.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa por 3 g

FABRICADO POR:
 TRIRX SEGRE
 Francia

IMPORTADO POR:
 MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
 Bogotá, Colombia