



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® KC

Registro ICA No.5325-DB
USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0,4 mL contiene:

Virus de Parainfluenza Canina Cepa Cornell

$\geq 10^3$ TCID₅₀

Bordetella bronchiseptica. Cepa BC2

$\geq 10^8$ UFC

Excipientes c.s.p.

0.4 mL

INDICACIONES

Vacuna para desarrollar la inmunidad activa contra la Tos de las perreras provocada por *Bordetella Bronchiseptica* y el virus de la Parainfluenza Canina.

ESPECIE DESTINO

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado para reconstituir

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Reconstituir la vacuna con el diluyente adjunto.

Remover el agua y conectar al aplicador.

Administrar 0.4 mL en un orificio nasal.

La vacuna se puede aplicar desde las dos semanas de edad.

En caso de alta exposición y antecedentes del criadero, se puede aplicar una dosis 72 horas antes del periodo de riesgo.

Revacunar anualmente.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C - 8°C



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco unidosis. Caja por 5, 10 y 25 dosis.

FABRICADO POR

Intervet International B.V
Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal S.A.S.
Bogotá, Colombia