



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® RL

Registro ICA No.7393-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna inactivada para la inmunización activa en perros contra la *Leptospira Canicola*, *Leptospira Icterohaemorrhagiae* y Rabia

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL de vacuna contiene:

| | |
|--|---------------------------------|
| Virus de Rabia inactivado cepa Pasteur RIVM | ≥ 3.0 UI |
| <i>Leptospira interrogans</i> serovar Canicola inactivada | ≥ 40 hámster DP ₈₀ * |
| <i>Leptospira interrogans</i> serovar Icterohaemorrhagiae inactivada | ≥ 40 hámster DP ₈₀ * |
| Excipientes c.s.p. | 1 mL |

* DP: Dosis Protectiva 80%

INDICACIONES

En perros para inmunización activa contra *Leptospira interrogans* serogrupos Canicola e Icterohaemorrhagiae, y Rabia.

ESPECIE DESTINO

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión Inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar una dosis (1 mL) vía subcutánea observando las usuales precauciones de asepsia.

La edad ideal para iniciar el plan vacunal contra la leptospira es a partir de la 8ª semana de edad y deben aplicarse al menos 2 dosis con un intervalo aproximado de 2-4 semanas.

En la fracción de Rabia, la primera vacunación debe realizarse a partir de la 12ª semana de edad. La combinación Nobivac® RL brinda la oportunidad de realizar una inmunización completa contra la Rabia y la Leptospirosis a partir de la 12ª semana de vida, y ofrece la posibilidad de ser usada como reconstituyente de cualquiera de las vacunas liofilizadas NOBIVAC® para perros.

El esquema de vacunación indicado deberá estar prescrito y suministrado por el Médico Veterinario.



Pauta de vacunación para cachorros donde es necesario iniciar un plan vacunal temprano (4-6 semanas de edad):

| | |
|--------------------|--|
| 4-6 semana de vida | Nobivac® Puppy DP o Nobivac® Parvo C |
| 8-9 Semana de Vida | Nobivac® DHP o Nobivac® DHPPi con Nobivac® L y con Nobivac® Corona |
| 12 semana de vida | Nobivac® DHP o Nobivac® DHPPi con Nobivac® L o Nobivac® RL y con Nobivac® Corona |

La vacunación contra Rabia debe establecerse de acuerdo con las disposiciones legales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son autolimitadas en la mayoría de los casos. Aplicar solamente en perros sanos.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Conservar refrigerada entre 2°C - 8°C.

No congelar. Proteger de la luz.

Deberá evitarse la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales elevadas una vez retirada de la nevera antes de usar; la potencia de la vacuna puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco de 1 dosis (1 mL), en estuches de 10 unidades.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal S.A.S.

Bogotá, Colombia