



FICHA TÉCNICA

EXZOLT® 5%

Registro ICA No. 11669-MV

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución pour-on contienen:

Fluralaner

50 mg

Excipientes c.s.p.

1 mL



INDICACIONES

En bovinos, en el tratamiento de infestaciones causadas por garrapatas de múltiples huéspedes *A. cajennense*, durante 5 semanas, por garrapatas de un solo huésped *R. microplus*, durante 6 semanas, y por moscas *H. irritans* (mosca de los cuernos), durante 2 semanas, y por larvas de *D. hominis*, durante al menos 4 semanas. Su acción es inmediata. El producto también está indicado para bovinos en el tratamiento de infestaciones provocadas por larvas de *C. hominivorax* (miasis) y puede utilizarse para prevenir dichas infestaciones tras procesos quirúrgicos, como la castración.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Pour-on

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El producto Exzolt® 5% debe ser administrado por vía pour-on a lo largo de la línea media dorsal de la cruz hasta la base de la cola del animal.

Administrarse a la dosis única de 2,5 mg de producto por cada Kg de peso vivo, equivalente a 1mL de producto por cada 20 Kg de peso corporal.

Para asegurar la administración de una dosis correcta, se debe determinar el peso corporal con la mayor precisión posible y se debe verificar la precisión del dispositivo dosificador antes de la administración.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Administrar el producto solo para las especies, dosis y vía de administración recomendadas. El producto no debe entrar en contacto con cursos de agua, ya que esto puede resultar peligroso para los animales invertebrados acuáticos. Producto tóxico en peces. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Cualquier producto veterinario no utilizado o material residual derivado de él debe eliminarse de acuerdo con la normatividad vigente.

Precauciones especiales para uso en animales: Aplicar el producto solo sobre la capa seca e intacta; evitar la exposición de los animales a la lluvia el día del tratamiento. Mantener a los animales tratados separados de los no tratados para evitar que se produzcan residuos en los animales no tratados.



Exzolt® 5% se puede usar en vacas gestantes. En estos casos, su uso debe ser evaluado por el Médico Veterinario responsables, considerando la relación beneficio/riesgo. No se ha establecido la seguridad reproductiva en toros reproductores.

2

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el producto a los animales: No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Se debe utilizar equipo de protección personal que consta de guantes, overoles y gafas de seguridad aprobados al manipular el producto. Evite el contacto con piel, ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia. En caso de derrame accidental, quitar inmediatamente la ropa afectada y lavar la piel afectada con agua y jabón; en caso de ingestión accidental, enjuáguese inmediatamente la boca con abundante agua y busque atención médica; evitar que los niños tengan acceso al producto o que estén en contacto con los animales tratados; lávese las manos después de su uso.

Instrucciones de primeros auxilios:

En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve el paciente al Médico y muéstrelle el prospecto o una copia de la etiqueta. No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático. En caso de intoxicación del animal, llamar al Médico Veterinario.

Contraindicaciones:

No usar en caso de hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes.

No usar en vacas lactantes que produzcan leche para consumo humano.

Disponga del envase de acuerdo con los programas de recolección postconsumo según disposiciones ambientales vigentes

Venta y aplicación bajo la dirección del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos

PERIODO DE RETIRO

CARNE: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de la aplicación.

LECHE: Este producto no debe aplicarse en animales en producción de leche para consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor a 30°C. No congelar.

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.

Una vez abierto el frasco, conservar el producto a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C) y utilizarlo en un plazo máximo de 6 (seis) meses.

Mantenga el envase bien tapado.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 250mL, 1 L y 5 L

FABRICADO POR

Argenta Manufacturing Limited
Nueva Zelanda

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal S.A.S.
Bogotá, Colombia