

FICHA TÉCNICA

FINADYNE® Solución inyectable

Registro ICA No.2084 DB

USO VETERINARIO



COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Flunixin Meglumina

82,95 mg

(Equivalente a 50mg de Flunixin)

Excipientes c.s.p

1 mL

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de la inflamación y el dolor asociados con trastornos osteomusculares y para el alivio del dolor visceral asociado al cólico. Como coadyuvante en el tratamiento de inflamación, dolor y elevación de temperatura asociados con mastitis y metritis.

Finadyne® es eficaz para combatir la inflamación, el dolor y la fiebre, actuando en los sistemas orgánicos (vasculares, respiratorio, nervioso, gastrointestinal, reproductor y ocular) afectados por las prostaglandinas.

El control del dolor se consigue de 15 minutos a 2 horas después de la inyección, especialmente en cólicos.

ESPECIES DESTINO

Bovinos, Equinos y Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos y Equinos: Vía intravenosa

Porcinos: Vía Intramuscular

Especies	Indicación	Dosis	Tratamiento Total
Equinos	Alteraciones músculo esqueléticas	1 x día hasta 5 días	1 ml/45 kg IV
	Cólicos (dolor)	Si no hay mejoría con 2 dosis, puede estar Indicada una intervención quirúrgica	1 ml/45 kg IV (más rápido)
Bovinos	Mastitis Aguda	1-2 veces con intervalos de 12 horas	2 ml/45 kg IV
	Dolor e inflamación (Vaca caída)	1-2 veces con intervalos de 12 horas	2ml/45kg IV
Porcinos	MMA (Metritis, Mastitis, Agalactia)	Repetir a las 12 horas si es necesario	2 ml/45 kg IM profunda
	Cojeras	Hasta 3 tratamientos con intervalos de 24 horas	2 ml/45 kg IM profunda



INFORMACIÓN ADICIONAL

Acción

Posee dos mecanismos de acción:

- Bloquea la producción de prostaglandinas que, a su vez, son la causa principal de dolor, inflamación y fiebre.
- Bloquea la acción de las prostaglandinas sobre células diana de los órganos efectores.

Eficacia

FINADYNE® es eficaz para combatir la inflamación, el dolor y la fiebre, actuando en los sistemas orgánicos (vasculares, respiratorio, nervioso, gastrointestinal, reproductor y ocular) afectados por las prostaglandinas. El control del dolor se consigue de 15 minutos a 2 horas después de la inyección, especialmente en cólicos.

Características

- Es el tratamiento ideal para controlar el dolor, la fiebre y la inflamación.
- Restablece la función física normal.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No usar durante las 48 horas anteriores al parto en bovinos. El uso en el postparto inmediato puede interferir con la involución uterina y la expulsión de las membranas fetales ocasionando retención de placenta.

No exceda la dosis recomendada ni la duración del tratamiento.

No usar en animales con enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, donde exista la posibilidad de úlcera o hemorragia gastrointestinal.

No usar en animales con hipersensibilidad conocida al flunixin o a alguno de los excipientes.

No administrar a yeguas gestantes.

No administrar a cerdas jóvenes durante el apareamiento ni en verracos reproductores.

Precauciones especiales para su uso en animales

Evitar la inyección intraarterial.

Su uso en animales menores de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada puede conllevar un riesgo adicional. Si no se puede evitar dicho uso, los animales podrían requerir una dosis reducida y un manejo clínico cuidadoso.

No usar en animales hipovolémicos, excepto en caso de endotoxemia o shock séptico.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales.

Las personas con hipersensibilidad conocida al flunixin deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.

Evitar el contacto con la piel o los ojos.

En caso de contacto con la piel, lavar la zona expuesta con agua.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con agua limpia y consultar a un médico.

Evitar la autoinyección accidental.

Lávese las manos después de usar.



3

TIEMPO DE RETIRO

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.

Los equinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 1 día después de finalizado el tratamiento.

Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 18 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de 25°C

PRESENTACIÓN COMERCIAL

FINADYNE® Solución inyectable es envasado en viales de 10 mL y 50 mL

FABRICADO POR

Trirx Segre

Francia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal S.A.S.

Colombia